

## Untitled Document

Ysbeerweer vier dié winter weer hoogty in die grootste deel van die Bronbeg-gebied. Vroegoggend lê d

Dou en ryp val nie op die grond nie, maar vorm direk op plante en ander voorwerpe. Dit is iets hee

Dit kan wel gebeur dat dou, wat reeds gevorm het, agterna vries om bevrore dou te vorm, maar die



Ryp smelt in die oggendsonnetjie, maar bly nog vir 'n rukkie in die skadu agter

*Foto: Wikipedia*

## Witryp

Daar is drie soorte ryp, waarvan twee redelik algemeen by ons voorkom. Witryp kan met sneeu v

Witryp word gevorm wanneer die lug naaste aan die grondoppervlak vinniger as die hoër lug afkoe

Die ryppunt is die temperatuur wat die lug moet bereik om atmosferiese vog te laat vries. Witryp is



Ryp op plantblare

*Foto: Tnews*

**Swartryp**

Waar witryp hoofsaaklik in wolklose nagte waar geen wind waai nie gevorm word, gaan swartryp

'n Laag yskoue lug word skielik ingewaai, wat temperature vinnig laat daal. Die gevolg is dat die selsap

Jy sal geen ys op die plante sien nie, omdat die lugvog naby die grondoppervlak te laag is. Al hoe



Ruigryp ("hoarfrost") op gras

*Foto: Wikipedia*

### Ruigryp

Ruigryp ("hoarfrost") lyk soos varingagtige kristalle. Dit kom in die lang winternagte van veral die

Baie mense sê dat ruigryp nie regtig ryp is nie, omdat dit nie die direkte oorgang van atmosferiese