

Untitled Document

Die rooibekkekelaar bly in familie-swarms van tot 12 voëls wat koöperatief saamwerk. Dit beteken dat d

Dié voëls se steelgewoontes geskied ook in groepverband. Hulle sal ander voëls wat in boomholte

In 'n studie wat oor 10 jaar gedoen is, is daar gemerk dat kakelaars eers probeer het om die insek

Van toe af het daardie swerm kakelaars elke insek-draende hoep-hoep mannetjie uitgelos en gew

Swarms kakelaars verskil glo van mekaar en spesifieke soorte steelgewoontes word in familie-gro



Die rooibekkekelaar

Foto's: Wikipedia

Broei

Kakelaars broei hoofsaaklik in die somer. Hulle maak nes in boomholtes en neem gewoonlik ander

Sy lê twee tot vier blou eiers wat na omtrent 18 dae uitbroei. Na 'n ruk ruik die nes glad nie meer g

Die rooibekkekelaar *Phoeniculus purpureus*, is 32–36 cm groot en weeg 60–90 gram. Dié voël het 'n

Kakelaars klouter rondom boomstamme om krake in die bas vir insekte te deursoek. Hulle kloue is



'n Onvolwasse voël met sy swart bek in 'n ou kuifkophoutkapper-nes

Kleur

Die geslagte lyk eners, maar onvolwasse voëls het 'n swart snawel. Die rooibekkekelaar se vere

Die rooibekkekelaar het wit vlekke op sy vlerke, wat sigbaar is as hy sit, en wit vlekke op die buitekant van sy vlerke.

'n Swerm kakelaars is 'n raserige spul wat hard kekkel en kwetter. Die lawaai begin stadig maar bou op.