

Untitled Document

Is dit die bruinlyster, olyflyster of roibeklyster wat jy in jou tuin sien rondhop? Dié drie lysters lyk baie e

Volgens die kenners is die olyflyster en bruinlyster eers 'n klompie jaar gelede, ná genetiese navor

Olyf

Die olyflyster, *Turdus olivaceus*, verkies digte struikgewas, beboste gebiede of woude

Sy borskant is meer oranje as dié van die bruinlyster en hy het 'n wit anus streek. Die olyflyster wo

Sy roep is 'n skerp 'tjienk' of yl 'tsieep'. Sy sang is 'n fluitagtige 'whieet-toe-whieet'.

As die mannetjie pronk, hang sy vlerke en sleep sy uitgespreide stert op die grond. Die bruinlyster



Die olyflyster, *Turdus olivaceus*

Bruin

Die bruinlyster, *Turdus smithi*, kan net met die olyflyster verwar word, maar hy is donkerder.

Bruinlysters word gewoonlik in pare gesien, maar interaksie tussen 'n hele groepie voëls is algemeen.

Die bruinlyster en olyflyster is althans 20–22 cm groot. Die rooibeklyster is 'n bietjie kleiner, teen 18 cm.



Die bruinlyster, ook geïdentifiseer as die bruinlyster, is 'n klein, donkerbruin voël met 'n geel-oranje bek. Dit is 'n algemene tuinvoël in Suid-Afrika.

Foto's: Wikipedia

Rooi

Die rooibeklyster, *Turdus libonyanus*, het 'n wit, fyn gespikkelde keel met breë swart kaakstreke.

Rooibeklysters bly saam met olyflysters in doringveld, oop boswêreld, parke en tuine. Hulle roep is 'n hoë, skerp klank.

Lysters skrop grootliks op die grond rond op soek na prooi. Die bruinlyster en olyflyster vreet mees



Die rooibeklyster, *Turdus libonyanus*

Broei

Lysters kan regdeur die jaar broei, maar die broei-spitstyd is gewoonlik van September tot Desember.

Olyflysters en bruinlysters bou 'n koppievormige nessesie, so twee tot nege meter bokant die grond in.

Die rooibeklyster sal soms ook stukkies tou, plastiek en papier in die nessesie inbou. So 'n nessesie word

Een tot drie blou eiers word na 14 tot 15 dae deur die wyfie uitgebroei. Die kleintjies kan na 16 dae